

# 【効能又は効果】 【用法及び用量】 追加のご案内

抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体

## テセントリク<sup>®</sup> 点滴静注 840mg、1200mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社より販売いたしております抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体「テセントリク<sup>®</sup> 点滴静注840mg、同1200mg」につきまして、下記のとおり「効能又は効果」および「用法及び用量」が追加となりましたのでご案内申し上げます。

従来の弊社製品同様、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

<p>効能又は効果</p>	<p>〈テセントリク点滴静注1200mg〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌</li> <li>○ PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法</li> <li>○ 進展型小細胞肺癌</li> <li>○ 切除不能な肝細胞癌</li> </ul> <p>〈テセントリク点滴静注840mg〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌</li> </ul> <p><u>〈製剤共通〉</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 切除不能な胞巣状軟部肉腫</li> </ul>
<p>用法及び用量</p>	<p>(略)</p> <p><u>〈切除不能な胞巣状軟部肉腫〉</u></p> <p><u>通常、成人にはアテゾリズマブ(遺伝子組換え)として1回1200mgを60分かけて3週間間隔で点滴静注する。通常、2歳以上の小児にはアテゾリズマブ(遺伝子組換え)として1回15mg/kg(体重)(最大1200mg)を60分かけて3週間間隔で点滴静注する。なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。</u></p>

(下線部が今回追加となりました。)

「注意事項等情報」等につきましては、最新の電子化された添付文書をご参照ください。